



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฉบับที่ 2

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการเพิ่มเติมจาก ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้ปฏิบัติตามประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในเขตพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยด้วยการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมดของวิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564

2. มาตรการการดูแลตนเองของบุคลากรและนักศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

2.1 กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ กลุ่มนี้จะได้รับการติดต่อประสานโดยตรงจากทีมสาธารณสุข

2.2 กลุ่มเฝ้าระวัง คือ ผู้ที่สัมผัสกับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง ตามข้อ 2.1 ให้สังเกตอาการ หลีกเลี่ยงไปที่ชุมชน และใส่หน้ากากอนามัย และดำเนินการตามแนวทางดูแลตนเอง (self-monitoring) ดังเอกสารแนบ

2.3 กลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง คือ กลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้ดูแลตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกนอกที่พัก หลีกเลี่ยงการไปที่แออัด ลังมือบอย ๆ ด้วยสนับ หรือแอลกอฮอล์ ทานร้อน ข้อนกลาง ไม่ใช้มือขี้ต่า จมูก หรือปาก เป็นต้น ขอให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อยืนในอาคาร หรือสถานที่ทำงาน/ห้องเรียน

3. พื้นที่การเดินทาง

3.1 ห้ามบุคลากรและนักศึกษาเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) (พื้นที่สีแดง) (จังหวัดสมุทรสาคร)*

3.1.1. หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สามารถเลิกได้ ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือหัวหน้าส่วนงาน และแจ้งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หลังจากกลับมาให้หยุดงานและแยกตัวเอง (self-quarantine) ดังเอกสารแนบ เป็นเวลา 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา

3.1.2. หากเดินทางไปด้วยเหตุอื่น ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการดีหรือหัวหน้าส่วนงาน และแจ้งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หลังจากกลับมาให้หยุดงานและแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน โดยให้ใช้วันลาภิหรือลาพักผ่อน

3.2 ให้บุคลากรและนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)
(สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร)*

3.2.1 หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการดีหรือหัวหน้าส่วนงาน และแจ้งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และให้ติดตามอาการใกล้ชิด (self-monitoring) งดร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ จนครบ 14 วันหลังจากเดินทางกลับ

*จังหวัดตามพื้นที่ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถ้น

ประกาศ ณ วันที่ 25 ส.ค. 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ)

อธิการบดี

เอกสารแบบ 1

แนวทางการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring)

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องพบปะกับผู้อื่น
- ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อย ๆ
- ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
- รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
- ไม่คุกคักกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า การโดยสารการขนส่งสาธารณะ เช่น ขึ้นเครื่องบิน รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถตุ๊กๆ

หากมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ เจ็บคอมีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบกรุณาโทรติดต่อเพื่อรับคำแนะนำ ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

เอกสารแนบ 2

คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเอง (self-quarantine) ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ณ ที่พักอาศัย

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปฏิบัติตามนี้

1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกห้อง ไม่ออกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะจนกว่าจะครบ 14 วัน นับจากวันสัมผัส

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างประมาณ

1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน

3. วัดไข้ทุกวัน หากมีไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ให้ติดต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน

4. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผู้อื่น จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ

6. หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชูที่ใช้แล้ว ให้ทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที

7. ท่านและทุกคนในบ้านควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่บ่อย ๆ

8. ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่พัก และเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ห้องน้ำบริเวณโถส้วม ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ำ 99 ส่วน)

9. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ำหรือซักผ้าด้วยน้ำร้อน ที่อุณหภูมิ 60 – 90 องศาเซลเซียส

10. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้านภายในระยะเวลา 14 วัน

11. หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้สูง เหนื่อยมากขึ้น แน่นหน้าอกรอบ หายใจไม่สะดวก กินไม่ได้ ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที

หมายเหตุ

ในการนี้ที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมาตรการให้ันมบุตร ยังสามารถให้ันมบุตรได้เนื่องจากปริมาณไวรัสที่ผ่านทางน้ำนมมีน้อยมาก แต่มาตรการควบรวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้ง ก่อนสัมผัสรือให้ันมบุตร